

NHS

Central and
North West London
NHS Foundation Trust

د هپتایټ یا ژیری مزمڼ ویروس (HBV)

د ناروغانو لپاره معلومات



Wellbeing for life



دا بروشور د **B** هپتایت یا ژیری مزمن ویروس (**HBV**) تشریح کوي له هغې ډلې څه ډول کیدای شي تاسو پرې اخته شئ، اصلي نښې نښانې یې کومې دي او څه ډول یې درملنه کیدای شي. که چېرې تاسو کومه پوښتنه یا اندېښنه لرئ، مهرباني وکړئ په آزادانه توګه له ډاکټرانو او یا هغو نرسانو سره خبرې وکړئ چې تاسو ته پاملرنه کوي.

HBV څه شی دي؟

HBV یو ویروس دی چې ستاسو ځيګر پرې مبتلا کېږي او په وینه کې موندل کیدای شي. د یو شمیر خلکو دفاعي سیستم د دې ورتبا لري چې HBV له مینځه یوسي، مګر په یو شمیر خلکو کې پاتې کېږي. که چېرې تاسو له 6 میاشتو څخه زیات په HBV باندې مبتلا وئ، هغې ته د B مزمن هپتایت یا ژیری یا مزمن HBV بولو.

د B شدید ژیری د مزمن ژیری پر وړاندې

غالباً HBV ته خاموشه ناروغي وايي، ځکه کیدای شي تاسو له کلونو راپدېخوا پرې مبتلا و اوسئ خو هیڅ نښې نښانې ونه لرئ او د ځيګر د زخم (سیروز) سبب شي. دا په خپل نوبت کیدای شي د ځيګر د عدم کفایې او سرطان (د ځيګر کارسینوم) سبب شي.

کله چې یو شخص د لومړي ځل لپاره په HBV باندې مبتلا کېږي، هغې ته حاد یا نوی عفونت ویل کېږي. ډیری لوی عمر لرونکي چې په دې ویروس باندې مبتلا کېږي هیڅ نښه نښانه نه لري او کولای شي د هیڅ ډول ستونزې پرته د دې ویروس له شر څخه خلاص شي. یو شمیر هغه لویان چې له شپږو میاشتو وروسته د دې ویروس له شر څخه خلاص نه شي هغې ته (مزمن عفونت) ویل کېږي.


د B په مزمن ژيري باندې د مبتلا كيدو خطر په مستقيم ډول د هغه شخص له عمر سره تړاو لري چې د لومړي ځل لپاره د B په ژيري باندې مبتلا كېږي. يو شخص چې هر څومره د ځوانۍ په عمر كې پرې مبتلا شي، د B په مزمن ژيري باندې د مبتلا كيدو خطر زيات دى.

- له 90 سلنو څخه زيات نوي زيږيدلي ماشومان د B په مزمن ژيري باندې مبتلا كېږي
- تر 50 سلنو پورې له يوه څخه تر پنځه كلونو پورې عمر لرونكي ماشومان د B په مزمن ژيري باندې مبتلا كېږي
- هغه لويان چې 19 كاله او يا له هغې څخه زيات عمر لري او په دې وپروس باندې مبتلا دي تر 95 سلنه پورې ښه كېږي او يوازې له دوى څخه 5 سلنه يې د B په مزمن ژيري باندې مبتلا كېږي
- په نړۍ كې د 240 ميليونو په شاوخوا كې خلك د B په مزمن ژيري باندې مبتلا دي. او د B په مزمن ژيري باندې د مبتلا خلكو له ډلې 30 سلنه د HBV اړوند روغتيايي ستونزو سره مخ كېږي.

ستاسو ځيگر ولې مهم دى؟

ځيگر د بدن تر ټولو لوى جامد غړى دى او د سينې قفس د ښي اړخ په پورتنۍ برخه كې موقعيت لري. دا يو حياتي غړى دى چې ډيرې اړينې دندې ترسره كوي:

- ستاسو بدن ته ټول داخليدونكي شيان پروسس كوي
- تغذيه كوونكي مواد په انرژۍ باندې بدلوي تر څو ستاسو بدن وكولاى شي له هغې څخه استفاده وكړي
- ستاسو له وينې څخه خطرناك مواد لرې كوي.



HBV څه ډول سرایت کوي

د B ژیری د لاندې لارو په واسطه سرایت کوي:

- د هغې مور د ماشوم لپاره چې نوی زېږېدلی دی، په ځانګړې توګه په هغو هیوادونو کې چې عفونت ډېر عام دی – په بریتانیا کې د ټولو میندوارو میندو لپاره د B ژیری د سکریټینګ ترسره کېږي. په ویروس باندې د مبتلا میندو نوي زېږېدلي ماشومان باید له ځنډ پرته له زېږېدلو وروسته واکسین شي تر څو له مبتلا کیدو څخه مخنیوی وشي.
- د نشه یي توکو تزریق کول، له یوې پیچکارۍ او د قاشوغې او فلتر په څیر د روغتیایي وسایلو څخه ګډه استفاده کول
- له کانډوم پرته له مبتلا شخص سره جنسي اړیکه درلودل
- په غیر روغتیایي چاپیریال کې له نا تعقیم شویو وسایلو سره د خالکوبۍ ترسره کول، د بدن سوري کول یا روغتیایي او د غاښونو درملنه ترسره کول
- په هغو هیوادونو کې د وینې ور کولو پر مهال د B د ژیري معاینه نه ترسره کېږي – اوسمهال په بریتانیا کې ټولې ډالۍ شوې وینې د عفونت د معلومولو له اړخه معاینه کېږي
- له مسواک او د په وینه باندې د ککړو د خړیلو له چارو څخه ګډه استفاده کول
- د یوې کارول شوې ستنې په واسطه په تصادفي ډول د پوستکي سوري کیدل (د ستنې له امله ټپ) – دا په عمد د ډول د روغتیایي پاملرنو د کار کوونکو لپاره یو خطر دی
- د B په ژیری باندې د مبتلا شخص وینه که چېرې په پرانیستي ټپ او یا غوڅ شوي ځای کې دننه شي – په ډیرو کمو مواردو کې کیدای شي د B په ژیري باندې د مبتلا شخص لخوا د خولې لګولو له امله هم ویروس خپور شي
- د B ژیری د مچې کولو، د لاسونو او په غیر کې نیولو، ټوڅي، پرنجی او یا د ګډو لوبښو څخه د استفاده کولو له لارې نه لیږدول کېږي.

څوک په B ژيړي باندي د مبتلا کيدو له لور خطر سره مخ دي

د B په ژيړي باندي لاندي کسان د مبتلا کيدو له لور خطر سره مخ دي:

- هغه خلک چې په داسې هيواد کې زيږيدلي وي چې په هغې کې دا ويروس ډير عام وي
- د B په ژيړي باندي د مبتلا ميندو څخه زيږيدلي ماشومان
- هغه خلک چې تر اوسه پورې يې نشه يي توکي تزريق کړي دي
- هغه اشخاص چې د داسې هيواد له يوه وگړي سره ناخوندي جنسي اړيکه ولري چې په هغه هيواد کې د B ژيړی عام وي، نارينه چې له نارينه وو سره جنسي اړيکه لري، گڼ شمير جنسي شريکان او سودگريز جنسي کارگران
- د کورنۍ د غړو په څير اشخاصو او يا داسې شخص سره نږدې اړيکه در لودل چې د B حاد يا مزمن ژيړی لري
- که چېرې له دې فعاليتونو څخه ډډه وشي، د هغو مسافرانو لپاره په ټوله کې د مبتلا کيدو د خطر کچه کمه ده چې داسې سيمو ته سفر کوي چې هلته د B ژيړی عام وي.

د لور خطر سيمې

د B ژيړی په ټوله نړۍ کې شتون لري، مگر په ځانگړې توگه په لاندي سيمو کې عام دی:

- د افريقا د صحرا سويلي برخه
- د آسيا ختيځ او سويل ختيځ
- د آرم سمندرگي جزاير
- د سويلي افريقا يو شمير سيمې
- د ختيځې او مرکزي اروپا سويلي برخې
- منځنی ختيځ
- د هند نيمه لويه وچه



څه ډول کولای شم په **HBV** باندې د نورو خلکو د مبتلا کیدو څخه مخنیوی وکړم؟

HBV د مخنیوي وړ ناروغي ده. اوس هم تاسو کولای شئ په یو بل په غیر کې ونیسئ، چاقو کان، قاشوغ پنچې، قاشوغې او پيالې شریکې کړئ یا وکاروئ. تاسو کولای شئ د لاندې مواردو په پام کې نیولو سره په **HBV** باندې د نورو خلکو د مبتلا کیدو څخه مخنیوی وکړئ:

- که چېرې دوی **HBV** نه لري، د خپلې کورنۍ غړي او جنسي شریکان معاینه کړئ او وروسته ورته واکسین وکړئ
- له گډو ستنو، د خریلو له تیغونو او د غاښونو له برسونو یا مسواک څخه کار مه اخلئ
- ډاډ ترلاسه کړئ چې هر ډول غوڅ شوي ځایونه په پلستر یا بنداز باندې وپوښئ
- د مرطوب ضد عفوني کوونکي دستمال (کلینل) یا له داسې محلولو څخه چې یوه برخه یې سپین کوونکې ماده او 9 برخې یې له اوبو څخه جوړ شوی وي استفاده وکړئ، له سطحو څخه د وینې هر څاڅکی ژر تر ژره او په خورا احتیاط سره پاک کړئ
- د کانډوم کارول – اغیزناک دي مگر 100 سلنه نه دي، له همدې امله مهمه ده چې ستاسو جنسي شریک واکسین شي.

څه ډول د ویروس د خپریدو مخه ونیسو:

- دا ناروغي په اصل کې د مبتلا شخص د بدن له مایعاتو سره د مستقیمې اړیکې له لارې لیدول کېږي – دا لیدل کیدای شي د وینې د تبادلې (د روغتیايي وسایلو په کارولو سره)، جنسي اړیکې او یا له مور څخه ماشوم ته د (عمودي) زیږون پر مهال ترسره شي.
- د **B** په ژیري باندې د مبتلا کیدو څخه د خونديتوب په موخه یو واکسین شته دی، مگر یوازې په هغه صورت کې کار کوي چې له وړاندې په **HBV** باندې مبتلا شوي نه وئ.
- دا واکسین کولای شو له مور څخه ماشوم ته د سرایت د مخنیوي په موخه کوچنیو ماشومانو ته تزریق کړو. د **B** په ژیري باندې د مبتلا میندو لپاره د شیدو ور کول امکان لري.
- که چېرې تاسو د **B** په ژیري باندې مبتلا یاستئ، اړینه ده چې د کورنۍ غړي، جنسي شریکان او په کور کې نور استوګن د مبتلا کیدو څخه د مخنیوي په موخه معاینه شي او واکسین ترلاسه کړي.
- که چېرې د **B** په ژیري باندې مبتلا یاستئ، اړینه ده چې د جنسي شریک سره د اړیکې پر مهال د کانډوم د کارولو، د پاکي، ستنې، ناخن گیر او هر داسې شي په کارول چې په غیر عمدي توګه د پرې کیدو او یا د وینې د بهیدو سبب کېږي، په څیر احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسئ.
- د **B** ژیری په لارو کې موندل کېږي، مگر د کور د گډو وسایلو لکه پيالو، چاقو گانو او قاشوغ پنچو په واسطه نه انتقالېږي.

د HBV نښې نښانې کومې دي؟


ډیری لویان په حاد HBV باندې د مبتلا کیدو پر مهال هیڅ ډول نښې نښانې نه څرگندوي. ماشومان او نوي زیږیدلي ماشومان د نښو نښانو د څرگندولو لپاره هیڅ تمایل نه لري. مزمن HBV په داسې حال کې چې هیڅ ډول نښې نښانې نه لري، خو که چېرې سیروز ولري نو نښې نښانې څرگندوي.

په ټوله کې، نښې نښانې په HBV باندې له مبتلا کیدو درې میاشتې وروسته څرگندیږي، مگر کیدای شي هر وخت د شپږو اونیو او شپږو میاشتو ترمنځ څرگند شي. معمولاً نښې نښانې د څو اونیو لپاره پاتې کیږي، مگر کیدای شي د شپږو میاشتو لپاره پاتې شي. ډیری هغه خلک چې په لوی عمر کې پرې مبتلا کیږي، حتی که چېرې د دوی نښې نښانې شدیدې هم وي، په بشپړه توګه روغ کیږي.

یو شمیر هغه خلک چې په مزمن HBV باندې مبتلا کیږي، د HBV دوامداره نښې نښانې لري، مګر د B په ژیري باندې مبتلا خلک له 20 څخه تر 30 کلونو پورې بې نښو نښانو پاتې کیږي.

کیدای شي نښې نښانې توپیر ولري، مګر کله چې څرگندیږي کیدای شي لاندې موارد پکې شامل وي:

- تبه
- څر رنګه تشې میتیازې
- د مفصلونو درد
- ضعف او ستړیا
- د اشتها له لاسه ور کول
- زړه بدې او کانګې
- ځیګر ته څیرمه د خیتې دردونه
- ژيروالی (د پوست ژيروالی او د سترګو سپین والی)



HBV څه ډول تشخيص کيږي؟

تانواعم ښو د هراپل ښراځ وا صیخشت د HBV د

<p>هوک هتوگ هپ تنووقع لاعف ږچ هونویتورپ هغه تابتا ږد د حطس (ډل HBsAg) د زاراده روم – هل HBV یشیادیکی ندب وساتس ای آ ږچ هراپل وووراک هگوت هپ دحاو د یریگ هزادنا د یسوی هخنم.</p>	<p>نچ ییتنا ږحطس د یریژ B د</p>
<p>ودیکی التبم د ږدناپ HBV هپ ږچ نیورتورپ هغه HBV تبتم وا لاعف ږږچ هک) یدیکنودووبش ونئسوی هخنم هل HBV وسات ږږچ هک وا ئرلو (ئسوا و تبتم).</p>	<p>ږداب ییتنا ږتسه د یریژ B د</p>
<p>هغه پروتین ږچ د خونديتوب لپاره معیار دی (هغه که د عفونت څخه د پاکولو یا د واکسین کولو په شکل کې وي).</p>	<p>ږداب ییتنا ږحطس د یریژ B د</p>
<p>رایعم هراپل تنووقع داح هو د ږچ نیورتورپ هغه دی.</p>	<p>یږداب ییتنا M د نچ ییتنا یلصرا یریژ B د نیبولگونومیا</p>
<p>یکنووک هتوگ هپ تنووقع لاعف ری د</p>	<p>نچ ییتنا یی د یریژ B د</p>
<p>یریکی ببس یلاومک د تنووقع د ږچ نیورتورپ هغه</p>	<p>ږداب ییتنا هراپل HBeAg د</p>
<p>هغه – لوک هزادنا رادقم د سوری د ږک هنیو هپ اد ږچ هدا د هخوم،تسای ږنلمرد رت وسات ږچ تخو (یو هن رو صیخشت د ږچ) یو مک ری د دیاب رادقم</p>	<p>راب یسوریو ای DNA یریژ B د DNA</p>

تانایاعم هراپل ولومولعم د ای تغور د رگیخ د وساتس

هلم اهل HBV د ای هزادنا بابهتلا د رگیخ د اد یوک هزادنا کی رحت	لی افورپ رگیخ د
پوم ون یو یباهتلا ریډ رگیخ وساتس ږیچ هک، ید رای عم ولودی د نرپ د ږنیو د اد وا ووتسا ږی یداع لپخ رگیخ وساتس ای آ ږچ ئی اوو هت پوم .هن هک وا یوک هرسرت هنوتی لاعف	لدیک ډنرپ ږنیو د
په دې کار سره ستاسو د وینې کمښت، ستاسو د عمومي روغتیا معیار او پلاسیلتونو شمیر چې کیدای شي د ځیگر د زخم په صورت کې ټیټ وي ارزول کیږي.	هنریمش ږنیو د هگوت هراپش هپ
د ناطرس د رگیخ د ږچ تانایاعم هغه ږنیو د ږیری لوراک هراپل صیخشت	نیئورپوتف افلا
هن تک هت تښروچ وا لکش رگیخ د ږچ نکس وی لوراک هراپل صیخشت د ناطرس د رگیخ د وا یوک ږیری هرسرت یکل UCLH هپ اد – ږیری	یفارگونوس رگیخ د
پوم نکس یوش هرسرت طک تېکرام هپ رمیتروم د (ږچ) کلک ای (ایعبط) مرن رگیخ ای آ ږچ یی او هت یالوک هغه زارادمه .ید (یوک هت وگ هپ مخ زوریس ږیرک همولعم هزادنا وروغ د ږک رگیخ هپ یش	(نکس وربی) یفارگوتسال رگیخ د

آیا زه به د هر ډول عفونت لپاره معاینه شم؟

موږ په HBV باندې ټول مبتلا ناروغان د نورو عفونتونو لپاره چې کیدای شي په همدې طریقه وموندل شي، معاینه کوو. په دې کې د انساني دفاعي سیستم د کمزوری ویروس (HIV)، د C ژیری ویروس (HCV) او د D ژیری ویروس (/ HDV دلته ژیری) په ټوله نړۍ کې له هرو 100 نفرو څخه چې په HBV باندې مبتلا کیږي، له هغوی څخه 10 نفر په HDV هم مبتلا دي. که چېرې تاسو هم په HDV باندې مبتلا یاستئ، کیدای شي ستاسو ځیگر ته ډیر ژر زیان ورسېږي. درملنه له HBV سره په کمه اندازه توپیر لري.

آيا کولای شم د مزمن HBV د درملنې لپاره درمل وکاروم؟

د HBV لپاره هيڅ ډول درملنه شتون نه لري، مگر د درملنې په واسطه د کنترول وړ دی. په HBV باندې ډير مبتلا اشخاص د هيڅ ډول درملنې پيل کولو ته اړتيا نه لري، مگر بايد د ټول عمر لپاره تر څارنې لاندې وي.

معمولاً درملنه په لاندې مواردو کې سپارښتل کېږي:

- ستاسو دفاعي سيستم پخپله ونه شي کولای د B ژيري کنترول کړي
- ځيگر ته د زيان رسيدو شواهد موجود وي

د B ژيري درمل کولای شي د وېروس د کنترول او ځيگر ته د زيان رسيدو د مخنيوي په برخه کې مرسته وکړي او يو شمير اشخاص د عمر تر پای پورې درملنې ته اړتيا لري. که چېرې تاسو د HBV سربيره HIV هم لرئ، تاسو اړ ياست چې د ټول عمر لپاره دا درمل وخورئ.



د مزمن HBV د درملنې لپاره کوم درمل کارول کېږي؟

تنوفویر او انتکاویر د HBV د درملنې لپاره کارول کېږي. تنوفویر معمولاً لومړني درمل دي چې د مزمن HBV د درملنې لپاره سپارښتل کېږي. که چېرې تاسو د ډوډو یا گردو کمزوری فعالیت/کمزوري هډوکي لرئ، انتکاویر سپارښتل کېږي. دواړه درمل د گوليو په ډول او معمولاً د ورځې یو ځل خورل کېږي. د دې درملو مروج جانبي عوارض عبارت دي له ناروغۍ، زړه بدۍ او سر گرځیدل دي چې معمولاً له څو دقیقو وروسته ښه کېږي.

اینترفرون یو بل ډول درمل دي چې په دې برخه کې کارول کېږي، مگر د HBV عفونت په ځانګړو مواردو (یا که چېرې HDV لرئ) سپارښتل کېږي. دا درمل د پیچکارۍ په ډول تر پوستکي لاندې په اونۍ کې یو ځل د 48 ساعتونو لپاره ور کول کېږي. دا مرسته کوي چې د HBV سره د مبارزې په موخه د بدن دفاعي سیستم پیاوړی کړي. مشهور جانبي عوارض د انفولانزا په څیر نښې نښانې لکه د درملو له خورولو وروسته تبه، د ماهیچو او مفصلونو درد، په داسې حال کې چې دا نښې نښانې د وخت په تیریدو سره ښې کېږي.

ځینې وخت د HBV د بیا ځلي فعالیتو څخه د مخنیوي په موخه لامیوودین تجویز کېږي، د بیلګې په توګه که چېرې تاسو کیموتراپی او نورې درملنې چې دفاعي سیستم ټکوي ترلاسه کوئ. دا د تنوفویر په څیر اغیز کوي، مگر د هغې په نسبت اغیزناک نه دي. له همدې امله معمولاً په انګلستان کې د B ژیري د درملنې لپاره نه کارول کېږي.

د B له ژيري سره ژوند کول

ستاسو د ژوند طرز ستاسو د عمومي روغتيا لپاره مهم دی، مگر هغه ستاسو د ځيگر د روغتيا لپاره هم مهم دی. تاسو کولای شئ د لاندې مواردو په نظر کې نيولو سره د ځيگر له روغتيا سره مرسته وکړئ:

- د مقعد او يا خوږې له لارې د ناخوندي جنسي اړيکې څخه ډډه وکړئ، مگر پرته له هغه صورت څخه چې تاسو ډاډ ولرئ چې ستاسو د ژوند شريک واکسين کړي دي او يا مبتلا کيدو څخه له وړاندې خوندي شوی وي
 - د هغو پيچکاريو له شريکولو څخه ډډه وکړئ چې له وړاندې د هغې په واسطه نورو خلکو ته درمل ور کړل شوي وي
 - احتياطي اقدامات لکه له نورو خلکو سره په گډه توگه د غاښونو د بورس او يا د خړيلو د چارې نه کارول (کيدای شي تاسو د کورنۍ د غړو په څير د نږدې اشخاصو واکسين کولو ته اړتيا ولرئ)
 - په ټوله کې يو سالم او متعادل غذايي رژيم ولرئ — د B په ژيري باندې د مبتلا اشخاصو لپاره ځانگړی غذايي رژيم شتون نه لري.
 - د الکولو مصرف محدود کړئ — دا کيدای شي د ځيگر د سيروز او زخمي کيدو په څير د ځيگر په شديدو ستونزو باندې د مبتلا کيدو خطر لوړ کړي
 - د سگرت څکولو څخه ډډه وکړئ ځکه دا د ځيگر په سرطان ستاسو د مبتلا کيدو خطر زياتوي
 - په منظم ډول فزيکي تمرينونه ترسره کړئ
 - که چېرې تاسو غواړئ چې ماشوم ولرئ نو له ډاکټر سره خبرې وکړئ
- د B په ژيري باندې مبتلا سنجې بايد طبيعي ميندواړي ولري، مگر دا به نظر دی چې په سر کې خپل پلانونه له ډاکټر سره شريک کړي، ځکه کيدای شي زياتې پاملرنې ته اړتيا ولري او د خپلو درملو بدلولو ته اړتيا ولري.
- دا خطر هم شته دی چې د B په ژيري باندې مبتلا ميندې د زيرون پر مهال خپل ماشوم ته وپروس وليږدوي، مگر په دواړو مواردو کې په ډاډ سره کولای شو له زيرون وروسته د ماشوم په واکسين کولو سره د دې خطر مخنيوی وکړو.

د نږدې کسانو (کورنۍ، غړو او شريکانو) معاينه او واکسين کول مهم دي.

تر څارنې لاندې نیول

- د B په څیړنې باندې ډیری مبتلا اشخاص درملنې ته اړتیا نه لري، دوی یوازې تر څارنې لاندې نیولو ته اړتیا لري. معمولاً دا کار په هرو شپږو میاشتو کې د وینې په معاینې او د یو شمیر خلکو لپاره د سکن کولو په واسطه ترسره کیږي.
- یو شمیر خلک پخپله ویروس له منځه وړي (که چېرې دا حالت رامنځته کیدونکی وي، نو له عفونت څخه وروسته د شپږو میاشتو په لړ کې ترسره کیږي). په همدې حال کې د B څیړنې یو اوږدمهاله مزمنه ناروغي ده، چې د عمر تر پایه څارنې ته اړتیا لري.
- که چېرې له HIV سره او یا له هغې پرته د B څیړنې لري، اړینه ده چې د څیړنې د یوه متخصص ټیم تر څارنې لاندې و اوسئ. سیمه ییز ټیم د مورټیمر بازار په مرکز کې، د بلومزبري په کلینک کې ځای په ځای شوی دی.
- موږ به تقریباً په هرو شپږو میاشتو کې یو ځل تاسو تر څارنې لاندې ونیسو او که چېرې موږ داسې و انگیرو چې تاسو درملنې ته اړتیا لري، کولای شو دا ستاسو لپاره هم مدیریت کړو.
- که چېرې تاسو د څیګر د زغم شواهد لري، معمولاً موږ سپارښتنه کوو چې د د پوهنتون یا کالج د څیګر ناروغيو متخصص او یا د رویال فري روغتون ته مراجعه وکړئ.



نورې سرچینې

British Liver Trust (د بریتانیا د ځیگر ترست)

مرستندویه کرښه: **0800 652 7330** (له دوشنبې تر جمعې ورځې پورې، د سهار له **10:00** څخه د

ماسپښین تر **3:00** بجو پورې)

[/britishlivertrust.org.uk/information-and-support
living-with-a-liver-condition/liver-conditions/hepatitis-b](http://britishlivertrust.org.uk/information-and-support-living-with-a-liver-condition/liver-conditions/hepatitis-b)

The Hepatitis B Positive Trust (د B ژیري مثبت ترست)

مرستندویه کرښه: **07958 558 510**

www.hepbpositive.org.uk

www.hepbpositive.org.uk/list-of-uk-hepatitis-support-groups

B ژیري: لارښود، معلومات او شنې

[/www.gov.uk/government/collections](http://www.gov.uk/government/collections)

hepatitis-b-guidance-data-and-analysis

Terrence Higgins Trust

[/www.tht.org.uk/hiv-and-sexual-health](http://www.tht.org.uk/hiv-and-sexual-health)

sexual-health/stis/hepatitis/hepatitis-b

په يوه ځغلنده کتنه کې حقايق

- د B ژيري داسې وپروس دی چې د التهاب په رامنځته کولو سره په بالقوه توگه زخم رامنځته کوي، مگر ډيری وخت هيڅ نښه نه څرگندوي.
- په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې موندل کېږي خو په افريقا او آسيا کې ډير عام دی..
- د B ژيري کولای شي ځيکر ته د دايمي زيان رسيدو (چې د سيروز) او ځيکر د سرطان په توگه پيژندل کېږي. د معاینې له لارې په دې باندې پوهيدل چې تاسو د B په ژيري باندې مبتلا ياست، د جانبي عوارضو د مخنيوي، د هغې د څارنې يا پيژندنې او يا مديريت لپاره لومړی گام دی.
- د B ژيري په راحتۍ سره د مديريت وړ دی او تاسو کولای شئ عادي ژوند وکړئ. تر ټولو مهم ټکی دا دی چې پوه شو چې تاسو هغه لړئ تر څو وکولای شو په سم ډول تاسو ته پاملرنه وکړو.



هذه الوثيقة متاحة أيضاً بلغات أخرى والأحرف الطباعية الكبيرة وبطريقة برايل للمكفوفين وبصيغة سمعية
عند الطلب

Arabic

این مدرک همچنین بنا به درخواست به زبانهای دیگر، در چاپ درشت و در فرمت صوتی موجود است.

Farsi

এই ডকুমেন্ট অন্য ভাষায়, বড় প্রিন্ট আকারে, ব্রেল এবং অডিও টেপ আকারেও অনুরোধ পাওয়া যায়
Bengali

Dokumentigaan waxaa xitaa lagu heli karaa luqado kale, daabacad far waa-wayn, farta indhoolaha (Braille) iyo hab dhegaysi ah markii la soo codsado.

Somali

Mediante solicitação, este documento encontra-se também disponível noutras línguas, num formato de impressão maior, em Braille e em áudio.

Portuguese

நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டால், இந்த ஆவணம் வேறு மொழிகளிலும், பெரிய எழுத்து அச்சிலும் அல்லது ஒலிநாடா வடிவிலும் அளிக்கப்படும்.

Tamil

Este documento también está disponible y puede solicitarse en otros idiomas, letra grande, braille y formato de audio.

Spanish

Dokument ten jest na życzenie udostępniany także w innych wersjach językowych, w dużym druku, w alfabecie Braille'a lub w formacie audio.

Polish

આ દસ્તાવેજ વિનંતી કરવાથી બીજી ભાષાઓ, મોટા છાપેલા અક્ષરો અથવા ઓડિઓ રચનામાં પણ મળી રહેશે.

Gujarati

Be belge istenirse, başka dillerde, iri harflerle, Braille ile (görme engelliler için) ve ses kasetinde de temin edilebilir.

Turkish